

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

16/06/2025 - 22/06/2025



COMPRENSORIO - CS - ZONA IONICA

ACRI
ALTOMONTE
CARIATI
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO-ROSSANO
PALUDI
SAN LORENZO DEL VALLO
SCALA COELI
SPEZZANO ALBANESE
TERRANOVA DA SIBARI

SAN DEMETRIO CORONE
CALOVETO
CROPALATI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	253	0	250%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA

DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA MOLTO CONSISTENTE, DI POCO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzetto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI SOPRA DEI 30 GRADI, CON UMIDITA' ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI TRATTARE, PER LE AZIENDE IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

16/06/2025 - 22/06/2025



COMPRENSORIO - CS - ZONA PREPOLLINICA

ALTOMONTE
CASTROVILLARI
FIRMO
LUNGRO
MORANO CALABRO
SAN BASILE
SARACENA
CASSANO ALLO IONIO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	247	0	250%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma al di sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCAE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

16/06/2025 - 22/06/2025



**COMPRENSORIO - CS - ZONA
TIRRENICA**

AIELLO CALABRO
AMANTEA
CLETO
FALCONARA ALBANESE
SAN PIETRO IN AMANTEA
SERRA D AIELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	257	0	250%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPRENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA MOLTO CONSISTENTE, DI POCO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia NON è facilmente riconoscibile nella fase fenologica attuale, ACCRESIMENTO DRUPA. La prima generazione comincia con il bruco, nel tardo inverno scava gallerie nelle foglie, successivamente erode le tenere foglioline e verso Aprile si impupa in un bozzoletto. La seconda generazione penetra nei boccioli floreali (mignole) e si incrisalida. La terza generazione è quella che provoca i danni più gravi, provocando la caduta delle olive e causando forti perdite.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state AL DI SOPRA DEI 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPRENSORIO DI TRATTARE, PER LE AZIENDE IN REGIME DI AGRICOLTURA BIOLOGICA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI mediante preparati a base di Bacillus thuringensis o Zeolite.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 01

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

16/06/2025 - 22/06/2025



COMPENSORIO - CS - ZONA VALLE CRATI

ACRI
BISIGNANO
LATTARICO
LUZZI
MENDICINO
MONTALTO UFFUGO
RENDE
ROSE
SAN FILI
SAN VINCENZO LA COSTA

SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA SOFIA D EPIRO
TORANO CASTELLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	247	0	250%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

1) Andamento del parassita

Dal monitoraggio effettuato, SI RILEVA NEL COMPENSORIO INTERESSATO UNA PRESENZA consistente DELLE CATTURE DEGLI ADULTI DI TIGNOLA, ma al di sotto DELLA SOGLIA DI INTERVENTO.

La sintomatologia è facilmente riconoscibile, nella fase fenologica attuale, allegagione; sull'infiorescenza DELL'OLIVO vi sono piccoli fili sericei, spesso visibili solo in controluce, che si intrecciano. LA PERCENTUALE Delle INFIORESCENZE ATTACCATE determina IL GRADO DI INFESTAZIONE DELLA TIGNOLA.

2) Andamento climatico e previsioni

LE TEMPERATURE REGISTRATE NELLA ZONA, SONO state al di SOTTO dei 30 GRADI, CON UMIDITÀ ELEVATA

3) Interventi fitosanitari

SI CONSIGLIA ALLE AZIENDE DEL COMPENSORIO DI EFFETTUARE TRATTAMENTI preventivi, poiche' la percentuale di infiorescenze attaccate, per ora, anche se al di Sotto del 30%, potrebbe nei prossimi giorni aumentare aiutata dalle condizioni meteo favorevoli. Per le aziende in bio SI consiglia di TRATTARE preventivamente mediante preparati a base di Bacillus thuringensis. o Zeolite.